

Mise en application et utilisation de la voie sous-cutanée

Concerne : patients palliatifs COVID-19 positifs à domicile, en EMS ou en institution

Sites d'injection

- Privilégier la région deltoïdienne et la régions sous-claviculaire (à 3 travers de doigt au-dessous du milieu de la clavicule)
- A défaut, utiliser :
 - La région abdominale (en dehors de la zone péri-ombilicale)
 - Face antérieure ou antérolatérale externe des cuisses (idéalement le 1/3 médian)
 - Région sus-scapulaire (région omoplate)
- A distance de tout système implanté (pacemaker, P.A.C,...) et stomie

Rappel

- Piquer dans une peau saine (pas d'œdème, ni d'hématome, ni d'inflammation, ni de troubles sensitifs)
- Eviter les endroits à risque de compression ou de frottement

Surveillance

- Aspect, couleur, chaleur de la région de ponction : si inflammation, hématome, abcès, nécrose → changement de site
- Réactions locales : placard blanc, œdème, rougeur, crépitement à la palpation → changement de site
- Sang au point de ponction → changement de site
- Douleurs au point d'injection, irritation, perfusion trop rapide → changement de site

Compatibilité des substances injectables

- Poser un venflon pédiatrique pour chaque substance